

Nº OS: 53495 Animal: Malbec
Espécie: Canina
Proprietário: Ana Maria Moraes
Requisitante: Stefany Carvalho Togni CR34V-6P 98058
Clínica: Archêvoa-SP Norte

Data: 26/04/2023
Raça: Yorkshire Terrier
Dt. Nasc.: 22/06/2011
Idade: 11a 10m 4d
Sexo: Macho

ULTRASSOM ABDOMINAL

- Fígado..... - Fígado ultrapassando moderadamente os limites caudais do arco costal; limites definidos, ecogenicidade predominantemente mantida e parênquima finamente heterogêneo devido à presença de pelo menos uma área de limites parcialmente definidos, discretamente heterogênea e ecogenicidade mista (predominantemente hipoeecogênica acompanhada por zonas ecogênicas), não apresentando notória reatividade durante estudo Doppler colorimétrico, localizada em região de transição entre lobo hepático medial e lateral direitos, medindo cerca de 1,09cm (Cr-Cd) x 1,02cm (LL) x 0,79cm (VD) (1*). Arquitetura vascular com diâmetro e trajeto preservado durante o presente estudo.
- (1*) Achado sugere hiperplasia nodular, porém não descartando diferencial para formação hepática. Sugere-se realização de acompanhamento ultrassonográfico para avaliação seriada, caso clínico julgue necessário.
- .. Achados ultrassonográficos compatíveis com moderada hepatomegalia.
- Vesícula biliar com parede regular de espessura normal (medindo cerca de 0,08cm); repleta por conteúdo anecogênico associado à presença de discreto material ecogênico depositado em fundo e em perneio (discreta lama biliar/ sedimentos arenosos).
- Baço..... - Baço respeitando os limites caudais do polo caudal renal esquerdo e os limites do antero abdominal esquerdo; limites definidos, ecogenicidade predominantemente mantida e parênquima finamente heterogêneo nas porções passíveis de avaliação às custas de ínfimas áreas puntiformes dispersas pelo parênquima esplênico (2*).

- Estômago e intestinos..... - Estômago preenchido por moderada quantidade de conteúdo gasoso produtor de artefato de reverberação, sobrepondo-se e interferindo na avaliação intraluminal gástrica e das estruturas abdominais adjacentes. Paredes com espessura preponderantemente dentro dos limites da normalidade ultrassonográfica (medindo cerca de 0,40cm) e estratificação parietal predominantemente mantida na porção passível de visualização.
- Duodeno preenchido por discreta quantidade de conteúdo mucóide/ gasoso produtor de artefato de reverberação, sobrepondo-se e interferindo na avaliação intraluminal duodenal e das estruturas abdominais adjacentes, apresentando paredes com espessura normal (medindo cerca de 0,21cm); estratificação parietal predominantemente mantida, acompanhado por ínfimo aumento da ecogenicidade em camada mucosa (provavelmente relacionado com formação de imagem secundária ao conteúdo gasoso intraluminal); peristaltismo predominantemente evolutivo nos segmentos passíveis de visualização.
- Jejunó preenchido por discreta quantidade de conteúdo mucóide/ gasoso produtor de artefato de reverberação, sobrepondo-se e interferindo na avaliação intraluminal jejunal e das estruturas abdominais adjacentes, apresentando paredes com espessura normal (medindo cerca de 0,27cm); estratificação parietal mantida e peristaltismo predominantemente evolutivo nos segmentos passíveis de visualização.
- Cólon apresentando estratificação parietal predominantemente preservada, paredes com espessura normal (medindo cerca de 0,16cm em sua porção descendente), preenchido por moderada quantidade de conteúdo heterogêneo (fecal/ gasoso).
- . Não foram observadas evidências ultrassonográficas compatíveis com processos obstrutivos totais durante a realização deste estudo.

Nº OS: 53495 Animal: Malbec
Espécie: Canina
Proprietário: Ana Maria Moraes
Registado: Stefany Carvalho Togni CRMV-SP 59058
Clínica: Anáclipe-SP Norte

Data: 26/06/2011
Raça: Yorkshire Terrier
Dt. Nasc.: 22/06/2011
Idade: 11a 10m 4d
Sexo: Macho

ULTRASSOM ABDOMINAL

Rins..... - Rins simétricos (esquerdo medindo cerca de 4,14cm e direito 3,99cm), dimensões dentro dos limites da normalidade ultrassonográfica; limites definidos, contornos predominantemente irregulares às custas de áreas com aspecto cístico (em antitero esquerdo medindo cerca de 0,61cm x 0,53cm e em direito cerca de 0,41cm x 0,25cm), discreta mineralização dos recessos pélvicos; região cortical apresentando-se em infima maior evidência (especialmente em antitero esquerdo), ecotextura moderadamente heterogênea às custas de infimas áreas puntiformes dispersas pelo parênquima (3*) e ecogenidade moderadamente aumentada bilateralmente. Definição e relação córtico-medular predominantemente preservadas. Não foram observadas evidências ultrassonográficas compatíveis com notórias litíases pélvicas ou hidronefrose durante a realização deste estudo.

(3*) Achado pode estar relacionado com fibrose/ mineralizações discrásicas (secundárias ou não a supostas endocrinopatias).

.. Achados ultrassonográficos compatíveis com senescência/ processo degenerativo crônico (correlacionar achados com a clínica e demais exames complementares).

Pâncreas..... - Segmentos pancreáticos medindo cerca de: lobo esquerdo 0,44cm (dimensões preservadas), corpo 0,71cm (limitrofe aos valores máximos da normalidade ultrassonográfica) e lobo direito 0,49cm de espessura (dimensões preservadas); contornos regulares, ecogenidade discretamente mista e parênquima finamente heterogêneo nas porções passíveis de avaliação, às custas de infimas áreas puntiformes dispersas pelo parênquima (4*); não visibilizando sinais ultrassonográficos compatíveis com presença de líquido livre nem aumento da ecogenidade dos planos gordurosos adjacentes durante o presente estudo.

(4*) Achado pode estar relacionado com fibrose/ mineralizações discrásicas (secundárias ou não a supostas endocrinopatias).

.. Correlacionar achados com a clínica, histórico e demais exames

Complementares:

Glândulas adrenais..... - Adrenal esquerda apresentando dimensões aumentadas e margens abauladas, especialmente em seu polo caudal (medindo cerca de 1,70cm x 0,50cm em seu polo cranial x 0,79cm em seu polo caudal); limites definidos, ecogenidade e distinção córtico-medular preponderantemente preservada nas porções passíveis de avaliação.

.. Achados ultrassonográficos compatíveis com hiperplasia adrenal esquerda, que pode estar acompanhada por endocrinopatia.

- Adrenal direita apresentando dimensões tendendo aos limites máximos da normalidade ultrassonográfica (medindo cerca de 1,34cm x 0,51cm em seu polo cranial x 0,47cm em seu polo caudal); limites definidos, ecogenidade mantida e distinção córtico-medular preservada nas porções passíveis de avaliação.
.. Correlacionar achados com a clínica e demais exames complementares.

Aorta e veia cava caudal..... apresentando calibres e trajetos preservados nas porções passíveis de avaliação durante o presente estudo.

Próstata..... apresentando formato ovoide preservado (comumente visibilizado em pacientes com histórico de orquiectomia); dimensões preservadas, medindo cerca de 1,39cm (craniocaudal) x 0,77cm (laterolateral) x 0,65cm (ventrodorsal), contornos regulares e definidos, parênquima predominantemente homogêneo e ecogenidade mantida.

Testículos..... não caracterizados em sua topografia habitual. Paciente apresenta histórico de orquiectomia.

Bexiga..... apresentando parede regular, com espessura normal (medindo cerca de 0,09cm), formato mantido, limites definidos e repleção adequada por conteúdo anecogênico associado à infima quantidade de material ecogênico em permeio (sedimentos arenosos/ microcristais).



Nº OS: 53495 Animal: Malbec
Espécie: Canina
Proprietário: Ana Maria Moraes
Requisitante: Steffany Carvalho Togni CRMV-SP 58058
Clínica: Ancilvepa-Sp Norte

Data: 26/04/2023
Raça: Yorkshire Terrier
Dt. Nasc.: 22/06/2011
Idade: 11a 10m 4d
Sexo: Macho

ULTRASSOM ABDOMINAL

Outros.....

- Linfonodo ilíaco medial esquerdo apresentando-se em maior evidência (unilateralmente); dimensões limitrofes aos valores máximos da referência ultrassonográfica (medindo cerca de 0,83cm x 0,62cm), limites definidos, contornos intimamente irregulares, formato abaulado e parênquima moderadamente heterogêneo.
- Correlacionar achados com a clínica e demais exames complementares para descartar possibilidade de discreto processo reacional inflamatório.

- Em zona subcutânea do abdômen cranial (antímero esquerdo) visibilizou-se pelo menos uma área de formato ovoide com contornos predominantemente regulares, limites definidos, finamente heterogênea (apresentando discretas estrias horizontais ecogênicas), predominantemente hipoeecogênica (apresentando sinais ultrassonográficos semelhantes ao tecido adiposo) não reativa durante estudo Doppler colorimétrico, medindo cerca de 0,51cm dorsoventralmente.

- Não há sinais ultrassonográficos compatíveis com líquido livre em cavidade abdominal nas porções passíveis de avaliação durante o presente estudo.

O valor preditivo de qualquer exame de diagnóstico por imagem depende da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do paciente.

NO: _____
DATE: 03-05

MALBEC

8:30 - 292 (Insulina)
11:30 - 125
13:43 - 193
15:32 - 273
17:40 - 112
19:37 - 253
20:31 - 312 (Insulina)
22:40 - 185

04-05

8:40 - 317