



Unidade Baeta Neves 24h
Rua Thales dos Santos Freire, 136
(11) 4336-7185

Unidade Campestre 24h
Av. dom Pedro II, 3309
(11) 4428-1222

Unidade Vila Alto de Sto André
Av. Martim Francisco, 802
(11) 4200-1160
Seg. a sáb. e feriados: 08h às 22h
Domingos: 08h às 19h (clínica não abre)

Acesse seu exame através do nosso site: drhato.com.br

Exame

Cliente: Cristiane de Jesus Oliveira
Animal: Ozzy, Canina, Shi Tzu, 14 anos., Macho, Código: 134161
Data: 27/03/23
Exame: Tomografia - 1 Segmento até 20 kg
Solicitante: Christian Von Siegert Joffe / CRMV : 33.706

Exame :

Técnica:
Método: Helicoidal – Multislice
Colimação: 16 x 1mm

Exame:

Tomografia computadorizada de abdômen nas fases pré-contraste e pós-contraste intravenoso.

Relatório:

Volumosa lesão expansiva localizada no lobo hepático medial esquerdo, de atenuação de partes moles e contrastação heterogênea, apresentando contornos irregulares e bocelados, medindo aproximadamente 12,0 cm x 10,8 cm x 7,4 cm. Está em íntimo contato com a parede lateral esquerda da vesícula biliar, deslocando e comprimindo-a para a direita, com o lobo quadrado, lobo lateral esquerdo e processo papilar e processo caudado do lobo caudado, sem sinais de infiltração para esses lobos. Determina grande efeito de massa, deslocando dorsalmente a veia porta além de desviar cranial, lateral, caudal e dorsal os demais lobos hepáticos. Desloca dorsal e caudalmente o estômago, caudal e medialmente o rim esquerdo e caudalmente o pâncreas - Considerar a possibilidade de lesão primária hepática a esclarecer (maligna ou benigna).

Nota-se ainda pequenos nódulos hepáticos hipovasculares no lobo lateral esquerdo, com até 1,0 cm, indeterminados, além de raros e possíveis cistos hepáticos nos lobos laterais, menores que 0,3 cm. Restante do fígado com dimensões normais. Vasos hepáticos de aspecto habitual. Não há dilatação das vias biliares.

Vesícula biliar normodistendida, com paredes de espessura normal, sem cálculos.

Discreto borramento da gordura peritoneal e pequena quantidade de líquido livre peritoneal adjacente à massa, entremeado a algumas alças intestinais e região hipogástrica ventral à esquerda.

Pâncreas com morfologia preservada e dimensões normais. Parênquima pancreático homogêneo, sem lesões focais. Ausência de dilatações ductais.

Baço com dimensões normais, parênquima homogêneo, sem lesões focais, deslocado caudalmente pelo efeito de massa.

Rins com morfologia preservada e dimensões normais. Parênquima renal homogêneo, sem lesões focais. Não há dilatação dos sistemas coletores. Ausência de nefrolitíase.

Adrenais com morfologia habitual, dimensões normais e parênquima de atenuação característica, sem lesões focais. A direita mede 1,5 cm (comp) x 0,5 cm (polo caudal) e a esquerda 1,4 cm (comp) x 0,6 cm (polo caudal).

Estômago preenchido por conteúdo alimentar e paredes normoespessas. Alças de delgado pouco preenchidas por conteúdo fluido e cólons por conteúdo gasoso, sem alterações.

Bexiga com boa repleção, com paredes regulares, sem cálculos no interior.

Próstata de dimensões aumentadas, contornos levemente irregulares e atenuação heterogênea, medindo 2,5 cm (comp) x 2,5 cm (larg) x 2,9 cm (alt).

Bolsa escrotal e testículos parcialmente visibilizados, sem alterações.

Glândulas ad-anaís pouco preenchidas por conteúdo hipodenso homogêneo, sem lesões focais.

Ausência de linfonodomegalias, notando-se apenas pequenos linfonodos portais, mesentéricos e retroperitoniais numerosos, de aspecto homogêneo e contornos regulares - reacionais.

Laudado por:
M.V. Simone Z. Cantoni
CRMV-SP: 11.788

Veterinário responsável : Simone Zanin Cantoni
CRMV : 11.788

[Clique aqui para imprimir esta página](#)

